

АБСТРАКТНЫЕ КЛОНЫ И ОПЕРАДЫ

С. Н. Тронин

Аннотация: Устанавливается связь между абстрактными клонами и операдами, которая состоит в том, что и клоны, и операды являются частными случаями более общего понятия, которое в данной работе называется W -операдой (ввиду большего внешнего сходства с операдами) и которое можно рассматривать как функтор на подкатегории W категории конечных ординалов, обладающей несколькими достаточно естественными свойствами. Когда W — категория, морфизмы которой — всевозможные биекции, многообразие W -операд рационально эквивалентно многообразию операд в традиционном смысле. Основной результат работы: если W совпадает с категорией всех конечных ординалов, то многообразие W -операд рационально эквивалентно многообразию абстрактных клонов.

Ключевые слова: операда, абстрактный клон, многообразие, рациональная эквивалентность

В данной работе устанавливается связь между абстрактными клонами, давно и хорошо известными алгебраистам [1, с. 317], и операдами, более распространенными пока в топологии [2, 3]. Коротко эту связь можно выразить так: и клоны, и операды являются частными случаями некоторого более общего понятия, которое в данной работе будет называться W -операдой (ввиду большего внешнего сходства с операдами) и которое можно рассматривать как функтор на подкатегории W категории конечных ординалов, обладающей несколькими достаточно естественными свойствами. Когда W — категория, морфизмы которой — всевозможные биекции, то W -операды — это операды в традиционном смысле. Если же W совпадает с категорией всех конечных ординалов, то W -операды, по сути, то же самое, что и абстрактные клоны (точнее, рационально эквивалентны им). Существуют и другие категории W , для которых определены W -операды, но их роль еще предстоит выяснить. Основным результатом данной работы был анонсирован в [4]. Заметим, что наличие тесной связи между клонами и операдами чувствовалось давно и само понятие операды (в линейном случае), по-видимому, впервые появилось под названием «клона полилинейных операций» [5]. Термин «операда» появился в работе [2] спустя три года. О современном состоянии теории операд можно судить, например, по работам [6–9]. К настоящему моменту большая часть того, что сделано в теории операд, относится так или иначе к топологии или к ее приложениям. В 2001 г. вышла монография [10], посвященная в основном операдам в категориях топологических пространств и цепных комплексов. Имеется также ряд статей, в которых операды изучаются в связи с их применениями в теории категорий, а также физике. Эти темы не имеют прямого отношения к данной работе, и мы

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 99–01–00469).

ограничимся только упоминанием о них. Несмотря на то, что понятие операды является, по сути, алгебраическим, именно с этой стороны оно пока изучено недостаточно. Цель данной работы — выявить одну из точек соприкосновения между теорией операд и классической алгеброй.

Напомним определение абстрактного клона (далее просто клона) в удобной для нас форме. *Клоном* называется семейство множеств $R = \{R(n) \mid n \geq 0\}$, причем в каждом $R(n)$, $n \geq 1$, выделено множество элементов (проекций) $p_{1,n}, \dots, p_{n,n}$ и для любой пары целых чисел $m > 0$, $n \geq 0$ определены операции суперпозиции $R(m) \times R(n)^m \rightarrow R(n)$, действие которых в данной работе будет обозначаться так: $(x, y_1, \dots, y_m) \mapsto [xy_1 \dots y_m]$. Строки $y_1 \dots y_m$ часто будут записываться как \bar{y} . Должны быть выполнены следующие свойства:

1) (ассоциативность) $[x[y_1\bar{z}] \dots [y_m\bar{z}]] = [[xy_1 \dots y_m]\bar{z}]$ для всех $x \in R(m)$, $y_i \in R(n)$, $\bar{z} = z_1 \dots z_n$, $z_j \in R(k)$, $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq k$;

2) $[p_{i,m}y_1 \dots y_m] = y_i$, $[xp_{1,m} \dots p_{m,m}] = x$ при любых таких же x, y_1, \dots, y_m .

Гомоморфизм f клона R в клон K — это семейство $f = \{f_n \mid n \geq 0\}$ отображений $f_n : R(n) \rightarrow K(n)$ такое, что должны быть выполнены свойства: $f_n([xy_1 \dots y_m]) = [f_m(x)f_n(y_1) \dots f_n(y_m)]$ и $f_n(p_{i,n}) = p_{i,n}$ для всех возможных значений n , m и для всех возможных значений аргументов функций.

Хорошо известно, что каждый клон R можно описать как семейство свободных алгебр некоторого многообразия универсальных алгебр с базисами из n элементов ($n = 0, 1, 2, \dots$). Базисными элементами являются проекции, а операция суперпозиции, по сути, есть подстановка вместо переменных свободной алгебры $R(m)$ с базисом из m элементов $p_{1,m}, \dots, p_{m,m}$ элементов из свободной алгебры $R(n)$, результат которой принадлежит $R(n)$.

Чтобы дать определение операды, необходимо предварительно ввести ряд понятий и обозначений. Пусть $n \geq 0$ — натуральное число. Всюду в дальнейшем $[n]$ означает множество $\{0, 1, \dots, n\}$. Обозначим через \mathbf{FSet} подкатеорию категории множеств с объектами $[n]$, $n \geq 0$, морфизмами которой являются такие отображения $f : [n] \rightarrow [m]$, что $f(0) = 0$ и $f^{-1}(0) = \{0\}$. Заметим, что категория \mathbf{FSet} изоморфна категории \mathbf{FinOrd} всех конечных ординалов, т. е. категории с объектами — множествами $\{1, \dots, n\}$, $n \geq 1$, морфизмами которой служат всевозможные отображения. Функтор, устанавливающий изоморфизм, сопоставляет объекту $[n] = \{0, 1, \dots, n\}$ объект $\{1, \dots, n\}$, а отображению $f : [n] \rightarrow [m]$ — его ограничение на подмножество $\{1, \dots, n\}$ множества $[n]$, образ которого принадлежит подмножеству $\{1, \dots, m\}$ множества $[m]$. Обратный функтор строится очевидным образом.

Категория \mathbf{FSet} обладает конечными копроизведениями, которые описываются следующим образом. Естественный изоморфизм $[n] \sqcup [m] \rightarrow [n + m]$ отображает $i \in [n]$ в $i \in [n + m]$, $j \in [m]$, $j > 0$ в $n + j \in [n + m]$. Поэтому если даны $f : [n] \rightarrow [m]$, $g : [p] \rightarrow [q]$, то $f \sqcup g : [n + p] \rightarrow [m + q]$ действует следующим образом: $(f \sqcup g)(i) = f(i)$ при $0 \leq i \leq n$, $(f \sqcup g)(j) = m + g(j)$ при $1 \leq j \leq p$.

Разбиением натурального числа n на m частей в данной работе будем называть неубывающее отображение вида $\alpha : [n] \rightarrow [m]$, являющееся морфизмом \mathbf{FSet} . Через P обозначим категорию с объектами $[n]$ и множествами морфизмов $P(n, m) = P([n], [m])$, состоящими из всевозможных разбиений n на m частей. Для $\alpha \in P(n, m)$ и для всех $1 \leq i \leq m$ положим $n_i = |\alpha^{-1}(i)|$. Тогда α можно отождествить с упорядоченной последовательностью (n_1, \dots, n_m) целых неотрицательных чисел длины m такой, что $n_1 + \dots + n_m = n$. Этим объясняется выбор термина. Если $\beta \in P(n, m)$, $\alpha \in P(m, k)$, $\alpha = (m_1, \dots, m_k)$, то β

можно записать в виде $(n_{1,1}, \dots, n_{1,m_1}, \dots, n_{k,1}, \dots, n_{k,m_k})$. Теперь композицию $\alpha\beta$ можно описать как последовательность $\left(\sum_{i=1}^{m_1} n_{1,i}, \dots, \sum_{i=1}^{m_k} n_{k,i}\right)$. В случае, когда $n_1 = \dots = n_m = k$, разбиение α будем обозначать через $\alpha = (k^m)$. Если $\alpha \in P(n, m)$, $\beta \in P(k, l)$ то $\alpha \sqcup \beta \in P(n+k, m+l)$ (хотя $[n+m]$ не является копроизведением $[n]$ и $[m]$ в P). Любое разбиение $\alpha : [n] \rightarrow [m]$, представленное в форме (n_1, \dots, n_m) , можно считать морфизмом $t_{n_1} \sqcup \dots \sqcup t_{n_m} : [n_1] \sqcup \dots \sqcup [n_m] \rightarrow [1] \sqcup \dots \sqcup [1] = [m]$, где t_k обозначает единственный морфизм категории \mathbf{FSet} из $[k]$ в $[1]$.

В категории \mathbf{FSet} , изоморфной топосу \mathbf{FinOrd} , существуют также расслоенные произведения. Нам понадобится их явный вид в одном частном случае. Далее через $[p, q]$ при $p \leq q$ будет обозначаться множество целых чисел $\{p, p+1, \dots, q-1, q\}$. Пусть $\alpha \in P(n, m)$, $f : [k] \rightarrow [m]$ — морфизм из \mathbf{FSet} . Рассмотрим расслоенное произведение (декартов квадрат) вида

$$\begin{array}{ccc} [n] \times_{[m]} [k] & \xrightarrow{\pi_2} & [k] \\ \pi_1 \downarrow & & f \downarrow \\ [n] & \xrightarrow{\alpha} & [m]. \end{array}$$

Лемма 1. *В категории \mathbf{FSet} это расслоенное произведение устроено следующим образом. Пусть $\alpha = (n_1, \dots, n_m)$. В качестве $[n] \times_{[m]} [k]$ можно взять объект $[n_{f(1)} + \dots + n_{f(k)}]$. При этом π_2 становится неубывающей сюръекцией, которую можно записать в виде разбиения $(n_{f(1)}, \dots, n_{f(k)})$. Проекция π_1 описывается так: ее ограничение на каждый отрезок $[n_{f(1)} + \dots + n_{f(j-1)} + 1, n_{f(1)} + \dots + n_{f(j)}]$ — неубывающая биекция на отрезок $[n_1 + \dots + n_{f(j-1)} + 1, n_1 + \dots + n_{f(j)}]$ и $\pi_1(0) = 0$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Используем кроме изоморфизма между \mathbf{FSet} и \mathbf{FinOrd} еще тот факт, что категория \mathbf{FinOrd} эквивалентна категории \mathbf{FinSet} всех конечных множеств и их отображений. Отображая с помощью этих двух эквивалентностей объект $[n] \times_{[m]} [k]$ в категорию \mathbf{FinSet} , получаем множество $X = \{(i, j) \mid 1 \leq i \leq n_{f(j)}, 1 \leq j \leq k\}$, причем $\pi_1((i, j)) = n_1 + \dots + n_{f(j-1)} + i$, $\pi_2(i, j) = j$. При обратном переходе в \mathbf{FinOrd} множество X отображается в объект, изоморфный объекту $\{1, 2, \dots, n_{f(1)} + \dots + n_{f(k)}\}$ этой категории, причем элементу (i, j) соответствует число $n_{f(1)} + \dots + n_{f(j-1)} + i$. При последующем переходе в \mathbf{FSet} к этому множеству добавляется 0, и оно превращается в $[n_{f(1)} + \dots + n_{f(k)}]$. Морфизмы π_1 и π_2 , как нетрудно убедиться, приобретают при этом вид, указанный в формулировке леммы. \square

Проекцию $\pi_2 = (n_{f(1)}, \dots, n_{f(k)})$ будем обозначать через αf . Преимущество такого обозначения в том, что если дано $g : [p] \rightarrow [k]$, то $\alpha(fg) = (\alpha f)g$. Проекцию π_1 обозначим через $f^*\alpha$. Следуя терминологии и обозначениям из [11], заметим, что $f^*\alpha$ есть не что иное, как подъем α вдоль f . Множество $[n_{f(1)} + \dots + n_{f(k)}]$ можно рассматривать как результат применения функтора замены базы, т. е. как $f^*[n]$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Рассмотрим подкатеорию $W \subseteq \mathbf{FSet}$ со всеми теми же объектами $[n]$, морфизмы которой должны удовлетворять следующим условиям:

- 1) если $f, g \in \text{Mor}(W)$, то $f \sqcup g \in \text{Mor}(W)$;

2) если $f : [k] \rightarrow [m]$ — есть морфизм из W , то для любого $\alpha \in P(n, m)$ имеет место включение $f^*\alpha \in W(f^*[n], [n])$.

Категорию W с указанными выше двумя свойствами будем называть *вербальной*.

Укажем несколько очевидных примеров вербальных подкатегорий.

1. Тривиальная категория Id , морфизмы которой — тождественные отображения вида $[n] \rightarrow [n]$ для всех $n = 0, 1, 2, \dots$.

2. Категория Σ , в которой $\Sigma(n, m)$ пусто при $n \neq m$, а $\Sigma(n, n) = \Sigma_n$, — группа подстановок n -й степени.

3. Категория P .

4. Категория Mon , морфизмами которой являются все мономорфизмы (т. е. инъекции) из F Set . То, что инъекции и мономорфизмы в F Set — это одно и то же, следует из эквивалентности категорий F Set и Fin Ord . Первое свойство из определения вербальной категории для Mon очевидно. Чтобы проверить второе, надо вспомнить, что в любом топосе из мономорфности f следует мономорфность $f^*\alpha$ для любого α .

5. Категория Epi , морфизмами которой являются все эпиморфизмы (т. е. сюръекции) из F Set . Как и выше, чтобы проверить это, проще всего использовать эквивалентность F Set и Fin Ord . Здесь надо использовать то, что в топосе Fin Ord из эпиморфности f следует эпиморфность $f^*\alpha$.

6. Если W_1 и W_2 — две вербальные категории, то вербальной является и категория $W_1 \cap W_2$, класс морфизмов которой есть $\text{Mor}(W_1) \cap \text{Mor}(W_2)$. В частности, $\text{Epi} \cap \text{Mon} = \Sigma$, $P \cap \Sigma = \text{Id}$.

7. Наконец, вся категория F Set также является вербальной.

Аналогично тому, как это сделано выше для расслоенных произведений, прямые произведения $[n] \times [k]$ в F Set можно описать следующим образом. Из обычного теоретико-множественного описания произведения как множества пар исключаются пары вида $(i, 0)$, $i > 0$, $(0, j)$, $j > 0$, после чего производится отождествление оставшегося подмножества с $[nk] \in \text{Ob}(\text{F Set})$, причем $(0, 0)$ соответствует элементу 0, а паре (i, j) , где $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq k$, соответствует $i + n(j - 1) \in [nk]$. Проекция на второй сомножитель $\pi_2 : [nk] \rightarrow [k]$ при этом оказывается морфизмом (n^k) из P . Первую проекцию $\pi_1 : [nk] \rightarrow [n]$ будем также обозначать через $\mu_{k,n}$. Она отображает в i , $1 \leq i \leq n$, элементы вида $i, i + n, i + 2n, \dots, i + (k - 1)n$. При отождествлении $[nk]$ с k -кратным копроизведением $\sqcup [n]$ то же самое отображение получается по универсальному свойству копроизведений из семейства тождественных отображений $[n] \rightarrow [n]$ (коконуса), взятых по одному для каждого «слагаемого» в копроизведении. Если даны $f : [n] \rightarrow [m]$, $g : [k] \rightarrow [l]$, то $f \times g : [nm] \rightarrow [kl]$ определяется формулой $i + (j - 1)n \mapsto f(i) + (g(j) - 1)m$.

Докажем одно существенное свойство вербальных подкатегорий F Set .

Лемма 2. Пусть W — вербальная подкатегория категории F Set , $f \in W([n], [m])$, $g \in W([k], [l])$. Тогда $f \times g \in W([nk], [ml])$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Представим $f \times g$ в виде композиции $f \times 1_{[k]} : [nk] \rightarrow [mk]$ и $1_{[n]} \times g : [mk] \rightarrow [ml]$. Легко заметить, что отображение $f \times 1$, действующее по правилу $i + (j - 1)n \mapsto f(i) + (j - 1)m$, совпадает с отображением

$$f \sqcup \dots \sqcup f : [nk] = [n] \sqcup \dots \sqcup [n] \rightarrow [m] \sqcup \dots \sqcup [m] = [mk].$$

Согласно определению вербальной категории отсюда следует, что $f \times 1 \in \text{Mor}(W)$. Из этого, однако, не вытекает автоматически, что $1 \times g \in \text{Mor}(W)$.

Воспользуемся таким фактом. В любой категории с прямыми произведениями квадрат

$$\begin{array}{ccc} X \times Y & \xrightarrow{1 \times g} & X \times Z \\ \pi_Y \downarrow & & \pi_Z \downarrow \\ Y & \xrightarrow{g} & Z \end{array}$$

будет декартовым. Здесь π_Y, π_Z обозначают проекции на соответствующие множители. Частным случаем этого является диаграмма

$$\begin{array}{ccc} [nk] & \xrightarrow{1 \times g} & [nl] \\ (n^k) \downarrow & & (n^l) \downarrow \\ [k] & \xrightarrow{g} & [l]. \end{array}$$

Отсюда согласно второму условию из определения вербальной категории следует, что $1 \times g \in \text{Mor}(W)$. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Пусть W — вербальная категория. W -операдой будем называть семейство множеств $R = \{R(n) \mid n \geq 0\}$ такое, что для любых упорядоченных последовательностей неотрицательных целых чисел (n_1, \dots, n_m) , $m \geq 1$, определены операции композиции $R(m) \times R(n_1) \times \dots \times R(n_m) \rightarrow R(n_1 + \dots + n_m)$, действие которых будет обозначаться так: $(x, y_1, \dots, y_m) \mapsto xy_1 \dots y_m = x(y_1 \dots y_m) = x\bar{y}$. Должен быть выделен также элемент $\varepsilon \in R(1)$ (единица операды). Список свойств, которыми по определению должна обладать операда, выглядит следующим образом.

1. (Ассоциативность) $x(y_1 \bar{z}_1) \dots (y_m \bar{z}_m) = (xy_1 \dots y_m) \bar{z}_1 \dots \bar{z}_m$ для любых $x \in R(m)$, $y_i \in R(n_i)$, $1 \leq i \leq m$, $\bar{z}_i = z_{i1} \dots z_{in_i}$, $z_{i,j} \in R(k_{ij})$, $1 \leq j \leq n_i$.

2. Имеют место равенства $\varepsilon x = x = x\varepsilon \dots \varepsilon$ для любого $x \in R(m)$, $m \geq 1$.

3. Соответствие $n \mapsto R(n)$ — ковариантный функтор, определенный на категории W , действие которого обозначается так: если $f \in W([n], [m])$, $x \in R(n)$, то $R(f)(x) = fx \in R(m)$. Отображение $R(f) : R(n) \rightarrow R(m)$ также будем иногда ради краткости обозначать через f .

4. Если $f_i : [n_i] \rightarrow [k_i]$, $1 \leq i \leq m$, — морфизмы категории W , $x \in R(m)$, $y_i \in R(n_i)$, то имеет место тождество $x(f_1 y_1) \dots (f_m y_m) = (f_1 \sqcup \dots \sqcup f_m)(xy_1 \dots y_m)$.

5. Если $f : [k] \rightarrow [m]$ является морфизмом W , $\alpha = (n_1, \dots, n_m) \in P(n, m)$, $x \in R(k)$, $y_i \in R(n_i)$, $1 \leq i \leq m$, то имеет место тождество $(fx)y_1 \dots y_m = (f^* \alpha)(xy_{f(1)} \dots y_{f(k)})$.

Тождества из пп. 4 и 5 можно найти (в несколько иной форме и в ином контексте) в книге [3].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Гомоморфизмом (или морфизмом) W -операды R в W -операду K будем называть семейство отображений $h = \{h_n \mid h_n : R(n) \rightarrow K(n), n \geq 0\}$ такое, что $h_1(\varepsilon) = \varepsilon$ и

$$h_{n_1 + \dots + n_m}(xy_1 \dots y_m) = h_m(x)h_{n_1}(y_1) \dots h_{n_m}(y_m)$$

во всех случаях, когда определены левая и правая части равенства. Кроме того, семейство h должно быть естественным преобразованием функторов из категории W .

Прежде чем сформулировать основные результаты работы, напомним необходимый нам вариант определения рациональной эквивалентности [12, 13].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4. Пусть Sets^ω — категория счетных семейств множеств, морфизмы которой определяются как счетные семейства отображений с «покомпонентной» композицией. Рассмотрим два многообразия (категории) \mathbf{M}_1 и \mathbf{M}_2 многоосновных алгебр со счетным семейством основ, и пусть $U_i : \mathbf{M}_i \rightarrow \text{Sets}^\omega$, $i = 1, 2$, — соответствующие забывающие функторы. Многообразия \mathbf{M}_1 и \mathbf{M}_2 будем называть *рационально эквивалентными*, если существует изоморфизм категорий (не просто эквивалентность!) $F : \mathbf{M}_1 \rightarrow \mathbf{M}_2$ такой, что выполнено строгое равенство $FU_1 = U_2$.

В [13] это свойство названо категорной эквивалентностью, но там же показано, что данное свойство равносильно рациональной эквивалентности, введенной и изученной А. И. Мальцевым в [12]. Доказательства для многоосновных алгебр, по сути, те же самые, что и для одноосновных. Неформально говоря, рациональная эквивалентность означает, что на одних и тех же множествах (в нашей ситуации на счетных семействах множеств) определены два набора операций и их можно выразить друг через друга взаимно обратным образом.

Категории абстрактных клонов и W -операд являются многообразиями многоосновных алгебр со счетным множеством основ, так как замкнуты относительно взятия произвольных прямых произведений, подобъектов (подклонов или подоперад) и гомоморфных образов. Обозначим их через Clones и W -Operads соответственно.

Отличия нашего определения Σ -операды от имеющихся в цитированной литературе, как показывает следующее утверждение, являются сугубо внешними.

Предложение. *Многообразию Σ -операд рационально эквивалентно многообразию собственно операд, т. е. таких операд, которые определяются в цитированной литературе.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Сначала заметим, что W -операду R можно рассматривать как контравариантный функтор на двойственной к W категории W^{op} . При таком подходе естественно писать xf вместо fx , а так как копроизведения в W^{op} становятся прямыми произведениями, то тождество из п. 4 выглядит так:

$$x(y_1 f_1) \dots (y_m f_m) = (xy_1 \dots y_m)(f_1 \times \dots \times f_m).$$

Пусть $W = \Sigma$. Очевидно, что морфизмы из W^{op} можно мыслить как подстановки, обратные к подстановкам из Σ , так что их умножение производится по правилу $\sigma \cdot \tau = \tau^{-1} \sigma^{-1}$. Если $\alpha = (n_1, \dots, n_m)$, $f = \sigma \in \Sigma_m$ (предполагаем $k = m$ в приведенной выше диаграмме, из которой определяется $f^* \alpha$), то $\sigma^* \alpha$ — подстановка, обратную к которой можно описать следующим образом. Разобьем упорядоченную последовательность $1, 2, \dots, n_1 + \dots + n_m$ на «блоки» — отрезки: $b_1 = [1, n_1]$, $b_2 = [n_1 + 1, n_1 + n_2]$, \dots , $b_m = [n_1 + \dots + n_{m-1} + 1, n_1 + \dots + n_{m-1} + n_m]$. Тогда $(\sigma^* \alpha)^{-1} = \begin{pmatrix} b_1 b_2 \dots b_m \\ b_{\sigma(1)} b_{\sigma(2)} \dots b_{\sigma(m)} \end{pmatrix}$. Эту подстановку многие авторы записывают так: $\sigma(n_1, \dots, n_m)$. В этих обозначениях свойство 5 из нашего определения операды приобретает следующий вид:

$$(x\sigma)y_1 \dots y_m = (xy_{\sigma(1)} \dots y_{\sigma(m)})\sigma(n_1, \dots, n_m).$$

Таким образом, действие функтора, сопоставляющего Σ -операде операду в том смысле, который используется в цитированной литературе, сводится, по сути, к изменению обозначений. \square

Напомним вкратце примеры операд, из которых будет видно сходство и отличие между операдами и клонами.

ПРИМЕР 1. Пусть X, Y — произвольные множества, и пусть $\text{Map}(X, Y)$ — множество всех отображений из X в Y . Положим $R(n) = \text{Map}(X^n, X)$, и определим композицию следующим образом. Пусть $\bar{x}_i \in X^{n_i}$, $1 \leq i \leq m$, $n_i \geq 0$, тогда $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_m \in X^{n_1 + \dots + n_m}$. Пусть $f \in R(m)$, $F_i \in R(n_i)$. По определению имеем $ff_1 \dots f_m(\bar{x}_1 \dots \bar{x}_m) = f(f_1(\bar{x}_1), \dots, f_m(\bar{x}_m))$. Другое название этой операции — бесповторная суперпозиция. Легко убедиться в ее ассоциативности, а также в том, что роль единицы ε играет тождественное отображение $X \rightarrow X$. Если $\sigma : [n] \rightarrow [m]$ — морфизм категории FSet , то для $f \in R(n)$, $\bar{x} = x_1 \dots x_m \in X^m$ положим $(\sigma f)(\bar{x}) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$. Свойства FSet -операды проверяются непосредственно.

ПРИМЕР 2. Положим $R(n) = \{\varepsilon_n\}$ при $n \geq 0$, и пусть при $m > 0$ композиция определяется так: $\varepsilon_m \varepsilon_{n_1} \dots \varepsilon_{n_m} = \varepsilon_{n_1 + \dots + n_m}$. Нетрудно убедиться, что композиция ассоциативна и что ε_1 играет роль единицы. Для $\sigma : [n] \rightarrow [m]$ (морфизма категории FSet) полагаем $\sigma \varepsilon_n = \varepsilon_m$. Выполнимость оставшихся свойств операды очевидна.

ПРИМЕР 3. Положим $R(n) = \Sigma_n$ для $n \geq 1$, и пусть $R(0)$ — одноэлементное множество. Если $\sigma_m \in R(m)$, $m > 0$, $\sigma_{n_i} \in R(n_i)$, $\alpha = (n_1, \dots, n_m) \in P(n_1 + \dots + n_m, m)$, то полагаем $\sigma \sigma_1 \dots \sigma_m = (\sigma^* \alpha)(\sigma_1 \sqcup \dots \sqcup \sigma_m)$. Это произведение подстановок из $\Sigma_{n_1 + \dots + n_m}$. В случае, когда какой-то n_i равен 0, соответствующее «слагаемое» σ_i пропускается. Чтобы получить Σ -операду, определяем действие Σ_n на $R(n)$ слева как умножение подстановок. Это один из самых известных примеров операд.

Сформулируем основной результат работы.

Теорема. Многообразие FSet -операд рационально эквивалентно многообразию абстрактных клонов.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Неформально говоря, будет показано, что структура абстрактного клона на R определяет некоторую структуру FSet -операды на том же семействе R , а структура FSet -операды на R определяет на R структуру клона и эти соответствия взаимно обратны.

Дадим теперь точное определение функтора F из категории FSet -операд в категорию Clones . Пусть дана операда R . Превратим ее в клон следующим образом. В качестве операции суперпозиции в клоне возьмем композицию отображений $R(m) \times R(n)^m \rightarrow R(nm) \xrightarrow{\mu_{m,n}} R(n)$. Левая стрелка здесь обозначает композицию в операде R . Иными словами, $[xy_1 \dots y_m] = \mu_{m,n}(xy_1 \dots y_m)$. Пусть $p_i^n : [1] \rightarrow [n]$ — морфизм FSet , отображающий 1 в $i \in [n]$, $1 \leq i \leq n$. Рассмотрим соответствующие отображения $p_i^n : R(1) \rightarrow R(n)$. В качестве проекций берутся элементы $p_{i,n} = p_i^n \varepsilon \in R(n)$. Проверим выполнение свойств из определения клона. Начнем с ассоциативности. Смысл обозначений тот же, что и в данном в начале работы определении клона. При проведении преобразований используются свойства 3, 4 и 1 из определения операды:

$$\begin{aligned} [x[y_1 \bar{z}] \dots [y_1 \bar{z}]] &= \mu_{m,k}(x[y_1 \bar{z}] \dots [y_m \bar{z}]) = \mu_{m,k}(x(\mu_{n,k}(y_1 \bar{z}) \dots (\mu_{n,k}(y_m \bar{z})))) \\ &= \mu_{m,k}(\mu_{n,k} \sqcup \dots \sqcup \mu_{n,k})(x(y_1 \bar{z}) \dots (y_m \bar{z})) \\ &= \mu_{m,k}(\mu_{n,k} \sqcup \dots \sqcup \mu_{n,k})((xy_1 \dots y_m) \bar{z} \dots \bar{z}). \end{aligned}$$

В последнем выражении $\mu_{n,k}$ и $\bar{z} = z_1 \dots z_n$ повторяются по m раз. С другой

стороны,

$$\begin{aligned} [[xy_1 \dots y_m] \bar{z}] &= [(\mu_{m,n}(xy_1 \dots y_m)) \bar{z}] = \mu_{n,k}((\mu_{m,n}(xy_1 \dots y_m)) \bar{z}) \\ &= \mu_{n,k}((\mu_{m,n})^* \alpha)((xy_1 \dots y_m) \bar{z} \dots \bar{z}). \end{aligned}$$

Здесь $\alpha = (k^n) \in P(nk, k)$ и последнее выражение получено в результате применения свойства 5 из определения операды, в котором роль f играет $\mu_{m,n} : [nm] \rightarrow [n]$. Строка $z_{f(1)} \dots z_{f(nm)}$, согласно определению $\mu_{m,n}$ является сцеплением \bar{z} с самой собой m раз. Необходимое нам равенство получится, если будет доказано, что имеет место равенство морфизмов из F Set:

$$\mu_{m,k}(\mu_{n,k} \sqcup \dots \sqcup \mu_{n,k}) = \mu_{n,k}((\mu_{m,n})^* \alpha).$$

Заметим сначала, что в любой категории с прямыми произведениями диаграмма

$$\begin{array}{ccc} X \times Y \times Z & \xrightarrow{\pi_{2,3}} & Y \times Z \\ \pi_{1,2} \downarrow & & \pi_1 \downarrow \\ X \times Y & \xrightarrow{\pi_2} & Y \end{array}$$

будет декартовым квадратом. Здесь буквой π обозначены соответствующие проекции, например, «поэлементно» $\pi_{2,3}(x, y, z) = (y, z)$, $\pi_1(y, z) = y$ и т. п. Рассмотрим категорию F Set и положим $X = [k]$, $Y = [n]$, $Z = [m]$. Тогда для приведенной выше диаграммы $X \times Y \times Z = [knm]$, $X \times Y = [kn]$, $Y \times Z = [nm]$, $\pi_1 = \mu_{m,n}$, $\pi_2 = (k^n) = \alpha$, $\pi_{2,3} = (k^{nm})$, $\pi_{1,2} = \mu_{m,kn}$. Но так как $\pi_{2,3} = (k^{nm})$ — неубывающее отображение, то из декартовости квадрата и определения $(\mu_{m,n})^* \alpha$ следует, что $(\mu_{m,n})^* (k^n) = \mu_{m,kn}$. Таким образом, требуется установить равенство

$$\mu_{m,k}(\mu_{n,k} \sqcup \dots \sqcup \mu_{n,k}) = \mu_{n,k} \mu_{m,nk}.$$

Чтобы убедиться в его справедливости, будем представлять $[knm]$ как копроизведение mn экземпляров $[k]$, $[mk]$ — как копроизведение m экземпляров $[k]$, $[nk]$ — как копроизведение n экземпляров $[k]$ и рассмотрим ограничение отображений в левой и правой частях на какое-либо «прямое слагаемое» $[k]$ в $[knm]$. Сначала представим $[knm]$ как копроизведение m экземпляров $[kn]$. По определению $\mu_{n,k}$ отображение $\mu_{n,k} \sqcup \dots \sqcup \mu_{n,k}$ переводит каждый экземпляр $[k]$ из j -го экземпляра $[kn]$, входящего в $[knm]$, тождественно на j -й экземпляр $[k]$ из $[km]$. Затем $\mu_{m,k}$ отображает этот j -й экземпляр тождественно на $[k]$. С другой стороны, $\mu_{m,nk}$ отображает каждый экземпляр $[nk]$ из $[knm]$ (здесь $[knm]$ рассматривается как копроизведение m экземпляров $[nk]$) тождественно на $[nk]$. Следовательно, каждый экземпляр $[k]$ из $[knm]$ тождественно отображается на соответствующий экземпляр «прямого слагаемого» $[k]$ из $[nk]$. Затем $\mu_{n,k}$ вновь переводит этот экземпляр $[k]$ тождественно на $[k]$. Таким образом, ограничение отображений в левой и правой частях доказываемого равенства на каждое «прямое слагаемое» $[k]$ из $[knm]$ — тождественное отображение, и равенство (а вместе с ним и ассоциативность суперпозиции в абстрактном клоне) установлено.

Осталось проверить свойства $p_{i,n} = p_i^n \varepsilon$. Пусть $x \in R(n)$. Тогда

$$\begin{aligned} [xp_{1,n} \dots p_{n,n}] &= \mu_{n,n} x((p_1^n \varepsilon) \dots (p_n^n \varepsilon)) \\ &= \mu_{n,n}(p_1^n \sqcup \dots \sqcup p_n^n)(x\varepsilon \dots \varepsilon) = \mu_{n,n}(p_1^n \sqcup \dots \sqcup p_n^n)x. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что необходимое равенство может быть получено из тождества $\mu_{n,n}(p_1^n \sqcup \dots \sqcup p_n^n) = 1_{[n]}$, которое легко вытекает из определений. Далее, пусть $\alpha = (n^m)$, $x_1, \dots, x_m \in R(n)$. Тогда, используя свойство 5 из определения операды, получим

$$[p_{i,m}x_1 \dots x_m] = \mu_{m,n}(p_i^m \varepsilon)(x_1 \dots x_m) = \mu_{m,n}((p_i^m)^* \alpha)(\varepsilon x_i) = \mu_{m,n}((p_i^m)^* \alpha)x_i.$$

Необходимое нам равенство получится, если будет доказано тождество $\mu_{m,n}((p_i^m)^*(n^m)) = 1_{[n]}$. Прямо из конструкции расслоенного произведения следует, что $(p_i^m)^*(n^m)$ — сохраняющая порядок биекция $[n]$ на i -е «прямое слагаемое» $[n]$ в nm . Осталось еще раз использовать тот факт, что ограничение $\mu_{m,n}$ на каждое такое «прямое слагаемое» является тождественным отображением. Это завершает построение клона. По определению если R — операда, то $F(R)$ — это только что построенный абстрактный клон. Легко убедиться, что гомоморфизм операд $h : R \rightarrow K$ таким же образом превращается в гомоморфизм клонов $F(h) : F(R) \rightarrow F(K)$. Это завершает построение функтора $F : \text{F Set-Operads} \rightarrow \text{Clones}$. Из самого построения видно, что если $U_O : \text{F Set-Operads} \rightarrow \text{Sets}^\omega$, $U_C : \text{Clones} \rightarrow \text{Sets}^\omega$ — забывающие функторы, то $U_C F = U_O$.

Построим обратный к F функтор G . Пусть K — абстрактный клон. Превратим соответствие $[n] \mapsto K(n)$ в функтор, определенный на категории F Set , полагая для $f : [n] \rightarrow [m]$ и $x \in K(n)$ значение $K(f)(x) = fx$ равным $[xp_{f(1),m} \dots p_{f(n),m}]$. Пусть дан еще один морфизм $g : [m] \rightarrow [k]$ категории F Set . Проверим, что $g(fx) = (gf)x$

$$\begin{aligned} g(fx) &= [[xp_{f(1),m} \dots p_{f(n),m}]p_{g(1),k} \dots p_{g(m),k}] \\ &= [x[p_{f(1),m}(p_{g(1),k} \dots p_{g(m),k})] \dots [p_{f(n),m}(p_{g(1),k} \dots p_{g(m),k})]]. \end{aligned}$$

Так как $[p_{f(i),m}(p_{g(1),k} \dots p_{g(m),k})] = p_{g(f(i),k)}$, последнее выражение есть $(gf)x$. Из определения клона также сразу следует $1_{[n]}x = [xp_{1,n} \dots p_{n,n}] = x$. Это завершает проверку функториальности.

Установим некоторые необходимые для дальнейшего соотношения. Пусть $x \in K(m)$, $x_i \in K(n)$, $1 \leq i \leq m$, $f : [n] \rightarrow [k]$ — морфизм F Set . Тогда

$$[x(fx_1) \dots (fx_m)] = f[xx_1 \dots x_m]. \tag{*}$$

В самом деле, если $\bar{p} = p_{f(1),k} \dots p_{f(n),k}$, то

$$[x(fx_1) \dots (fx_m)] = [x[x_1\bar{p}] \dots [x_m\bar{p}]] = [[xx_1 \dots x_m]\bar{p}] = f[xx_1 \dots x_m].$$

Пусть $\alpha = (n_1, \dots, n_m) \in P(n, m)$. Определим отображения $r_i = r_i(\alpha) : [n_i] \rightarrow [n_1 + \dots + n_m] = [n]$, $1 \leq i \leq m$, полагая $r_i(0) = 0$, $r_i(j) = n_1 + \dots + n_{i-1} + j$ при $1 \leq j \leq n_i$ (подразумевается, что $n_0 = 0$). Эти морфизмы образуют коконус, соответствующий разложению $[n_1 + \dots + n_m] = [n_1] \sqcup \dots \sqcup [n_m]$. Если для всех i заданы $f_i : [n_i] \rightarrow [k_i]$ из F Set и $\beta = (k_1, \dots, k_m)$, то имеют место коммутативные диаграммы

$$\begin{array}{ccc} [n_i] & \xrightarrow{r_i(\alpha)} & [n_1 + \dots + n_m] \\ f_i \downarrow & & \sqcup_{j=1}^m f_j \downarrow \\ [k_i] & \xrightarrow{r_i(\beta)} & [k_1 + \dots + k_i]. \end{array} \tag{**}$$

Определим композицию операды следующим образом:

$$\begin{aligned} xx_1 \dots x_m &= [x(r_1x_1) \dots (r_mx_m)] \\ &= [x[x_1p_{1,n} \dots p_{n_1,n}][x_2p_{n_1+1,n} \dots p_{n_1+n_2,n}] \dots [x_mp_{n_1+\dots+n_{m-1}+1,n} \dots p_{n,n}]]. \end{aligned}$$

Здесь $x \in K(m)$, $x_1 \in K(n_1)$, \dots , $x_m \in K(n_m)$, $n = n_1 + \dots + n_{m-1} + n_m$. Проверим сначала аксиомы F Set-операды, связанные с действием морфизмов F Set:

$$\begin{aligned} x(f_1x_1) \dots (f_mx_m) &= [x(r_1(\beta)f_1x_1) \dots (r_m(\beta)f_mx_1)] \\ &= [x((\sqcup f_i)r_1(\alpha)x_1) \dots ((\sqcup f_i)r_m(\alpha)x_m)] \\ &= (\sqcup f_i)[x(r_1(\alpha)x_1) \dots (r_m(\alpha)x_m)] = (f_1 \sqcup \dots \sqcup f_m)(xx_1 \dots x_m). \end{aligned}$$

Пусть теперь $x \in K(k)$, $x_i \in K(n_i)$, $1 \leq i \leq m$, и задан морфизм $f : [k] \rightarrow [m]$ категории F Set. Положим $\alpha = (n_1, \dots, n_m)$, $r_i = r_i(\alpha)$ и $\bar{z} = (r_1x_1) \dots (r_mx_m)$. Тогда

$$\begin{aligned} (fx)(x_1 \dots x_m) &= [(fx)\bar{z}] = [[xp_{f(1),m} \dots p_{f(1),m}]\bar{z}] \\ &= [x[p_{f(1),m}\bar{z}] \dots [p_{f(k),m}\bar{z}]] = [x(r_{f(1)}x_{f(1)}) \dots (r_{f(k)}x_{f(k)})]. \end{aligned}$$

Вспоминая, что $\alpha f = (n_{f(1)}, \dots, n_{f(k)})$, и пользуясь легко проверяемым равенством $r_{f(i)}(\alpha) = (f^*\alpha)r_i(\alpha f)$, получим следующую цепочку преобразований:

$$\begin{aligned} [x(r_{f(1)}x_{f(1)}) \dots (r_{f(k)}x_{f(k)})] &= [x((f^*\alpha)r_1(\alpha f)x_{f(1)}) \dots ((f^*\alpha)r_k(\alpha f)x_{f(k)})] \\ &= (f^*\alpha)[x(r_1(\alpha f)x_{f(1)}) \dots (r_k(\alpha f)x_{f(k)})] = (f^*\alpha)(xx_{f(1)} \dots x_{f(k)}). \end{aligned}$$

Кроме того, при $x \in K(k)$, $x_1, \dots, x_m \in K(n)$, $f \in \text{F Set}([k], [m])$ в клоне K имеет место тождество

$$[(fx)x_1 \dots x_m] = [xx_{f(1)} \dots x_{f(k)}]. \quad (***)$$

В самом деле,

$$\begin{aligned} [(fx)x_1 \dots x_m] &= [[xp_{f(1),m} \dots p_{f(k),m}]x_1 \dots x_m] \\ &= [x[p_{f(1),m}x_1 \dots x_m] \dots [p_{f(k),m}x_1 \dots x_m]] = [xx_{f(1)} \dots x_{f(k)}]. \end{aligned}$$

Единица строящейся операды — элемент $\varepsilon = p_{1,1} \in K(1)$. Проверим определение. Пусть $x \in K(n)$. Тогда $\varepsilon x = [p_{1,1}x] = x$ по определению $p_{1,1}$. С другой стороны,

$$x\varepsilon \dots \varepsilon = [x[p_{1,1}p_{1,n}][p_{1,1}p_{2,n}] \dots [p_{1,1}p_{n,n}]] = [xp_{1,n}p_{2,n} \dots p_{n,n}] = x.$$

Завершая построение операды, покажем ассоциативность композиции.

Пусть $x \in K(m)$, $y_i \in K(n_i)$, $1 \leq i \leq m$, $\bar{z}_i = (z_{i1} \dots z_{in_i})$, $z_{ij} \in K(k_{ij})$, $1 \leq j \leq n_i$. Положим $k_i = k_{i1} + \dots + k_{in_i}$, $1 \leq i \leq m$, $\beta = (k_1, \dots, k_m)$, $r_i = r_i(\beta) : [k_i] \rightarrow [k_1 + \dots + k_m]$, $\beta_i = (k_{i1}, \dots, k_{in_i})$, $r_{ij} = r_{ij}(\beta_i) : [k_{ij}] \rightarrow [k_i]$, $\alpha = (n_1, \dots, n_m)$, $\tilde{r}_i = r_i(\alpha) : [n_i] \rightarrow [n_1 + \dots + n_m]$, $\gamma = (k_{11}, \dots, k_{1n_1}, \dots, k_{m,1}, \dots, k_{mn_m})$, $r'_{ij} = r_{ij}(\gamma) : [k_{ij}] \rightarrow [\sum_{i,j} k_{ij}]$. Легко проверяется, что $r'_{ij} = r_i r_{ij}$. Будем писать $\tilde{r}'_i \bar{z}_i$ вместо $(r'_{i1}z_{i1}) \dots (r'_{in_i}z_{in_i})$ и \bar{z} вместо $(\tilde{r}'_1 \bar{z}_1) \dots (\tilde{r}'_m \bar{z}_m)$. Напомним также правило действия отображения $f : [p] \rightarrow [q]$ на строку вида $\bar{a} = a_1 \dots a_q$: $\bar{a}f = a_{f(1)} \dots a_{f(p)}$. Мы будем применять его для сокращения записи. При этих обозначениях имеет место соотношение $\tilde{z}r'_i = \tilde{r}'_i \bar{z}_i$. В нижеследующих преобразованиях используются установленные ранее тождества, причем (***) можно записать в форме $[(fa)\bar{b}] = [a(\bar{b}f)]$:

$$\begin{aligned} x(y_1 \bar{z}_1) \dots (y_m \bar{z}_m) &= [x(r_1(y_1 \bar{z}_1)) \dots (r_m(y_m \bar{z}_m))] \\ &= [x(r_1[y_1(r_{11}z_{11}) \dots (r_{1n_1}z_{1n_1})]) \dots (r_m[y_m(r_{m1}z_{m1}) \dots (r_{mn_m}z_{mn_m})])] \\ &= [x[y_1(r_1r_{11})z_{11} \dots (r_1r_{1n_1})z_{1n_1}] \dots [y_m(r_mr_{m1})z_{m1} \dots (r_mr_{mn_m})z_{mn_m}]] \\ &= [x[y_1(r'_{11}z_{11}) \dots (r'_{1n_1}z_{1n_1})] \dots [y_m(r'_{m1}z_{m1}) \dots (r'_{mn_m}z_{mn_m})]]. \end{aligned}$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} (xy_1 \dots y_m)(\bar{z}_1 \dots \bar{z}_m) &= [[x(r'_1 y_1) \dots (r'_m y_m)](\bar{r}'_1 \bar{z}_1 \dots (\bar{r}'_m \bar{z}_m)] \\ &= [[x(r'_1 y_1) \dots (r'_m y_m)]\bar{z}] = [x[(r'_1 y_1)\bar{z}] \dots [(r'_m y_m)\bar{z}]] \\ &= [x[y_1(\bar{z}r'_1)] \dots [y_m(\bar{z}r'_m)] = [x[y_1(\bar{r}'_1 \bar{z})] \dots [y_m(\bar{r}'_m \bar{z})]]. \end{aligned}$$

Таким образом, ассоциативность доказана. Построенную операду обозначим через $G(K)$. Из приведенных выше соотношений легко следует, что для любого гомоморфизма клонов $f : K \rightarrow H$ то же самое семейство отображений $\{f_n \mid n = 0, 1, \dots\}$ становится гомоморфизмом операд $G(K) \rightarrow G(H)$. Рассматривая его в этом качестве, обозначим через $G(f)$. Таким образом, построен функтор $G : \text{Clones} \rightarrow \text{F Set-Operads}$.

Осталось проверить взаимную обратность функторов F и G , т. е. взаимную обратность построенных переходов от операд к клону и от клона к операде. Пусть дана операда R с композицией $xx_1 \dots x_m$, и пусть построен клон с суперпозицией $[xx_1 \dots x_m]$. Рассмотрим операду, строящуюся по этому клону так, как это было сделано выше. Прежде всего необходимо убедиться, что для любого морфизма из F Set вида $f : [n] \rightarrow [m]$ и любого $x \in R(n)$ имеет место равенство $fx = [xp_{f(1),m} \dots p_{f(n),m}]$. В самом деле,

$$\begin{aligned} [xp_{f(1),m} \dots p_{f(n),m}] &= \mu_{m,n}(x(p_{f(1)}^m \varepsilon) \dots (p_{f(n)}^m \varepsilon)) \\ &= \mu_{m,n}(p_{f(1)}^m \sqcup \dots \sqcup p_{f(n)}^m)(x\varepsilon \dots \varepsilon). \end{aligned}$$

Следовательно, вопрос сводится к тождеству $\mu_{m,n}(p_{f(1)}^m \sqcup \dots \sqcup p_{f(n)}^m) = 1_{[n]}$, которое непосредственно вытекает из определений. Таким образом, обе операды, исходная и построенная по клону, совпадают как функторы. Установим совпадение композиций. Пусть $x \in R(m)$, $\alpha = (n_1, \dots, n_m)$, $n = n_1 + \dots + n_m$, $r_i = r_i(\alpha) : [n_i] \rightarrow [n]$, $x_i \in R(n_i)$, $1 \leq i \leq m$. Тогда

$$[x(r_1 x_1) \dots (r_m x_m)] = \mu_{m,n}(r_1 \sqcup \dots \sqcup r_m)(xx_1 \dots x_m).$$

Необходимое нам равенство следует из легко проверяемого тождества $\mu_{m,n}(r_1 \sqcup \dots \sqcup r_m) = 1_{[n]}$.

Обратно, пусть дан клон K с суперпозицией $[xx_1 \dots x_m]$. Построим, как было сделано выше, операду с композицией $xx_1 \dots x_m$ и по ней — новую суперпозицию. Убедимся, что она совпадает с исходной. Пусть $x \in K(m)$, $x_i \in K(n)$, $1 \leq i \leq m$, $\alpha = (n^m)$, $r_i = r_i(\alpha) : [n] \rightarrow [nm]$, $1 \leq i \leq m$. Тогда, используя (*), получим

$$\mu_{m,n}(xx_1 \dots x_m) = \mu_{m,n}[x(r_1 x_1) \dots (r_m x_m)] = [x(\mu_{m,n} r_1 x_1) \dots (\mu_{m,n} r_m x_m)].$$

Остается несложная проверка того, что $\mu_{m,n} r_i = 1_{[n]}$ для всех i . Очевидно также, что элементы $p_{i,n}$ одни и те же и в исходном клоне, и в построенном по операде. \square

Более детальный анализ определений клона и операд показывает, что можно дать их переформулировку для произвольной категории с конечными прямыми произведениями и терминальным объектом I . При этом «выделенные элементы» становятся морфизмами с областью определения I . Например, аналоги элементов $p_{i,n} \in R(n)$ (для клона) — морфизмы вида $I \rightarrow R(n)$. Аналогами тождеств из определений клона и операд являются коммутативные диаграммы. Доказательство приведенной выше теоремы полностью переносится

на этот категорный случай, так как все проделанные в нем выкладки сводятся к проверкам коммутативности некоторых диаграмм. Само доказательство в принципе остается точно таким же.

Значительно интереснее дело обстоит в многоосновном случае, так как здесь существенно меняется точка зрения на смысл понятия операды, которое становится естественным многомерным обобщением понятия категории. А именно, «стрелки» могут иметь не одно начало и один конец, как в категориях, а несколько начал (входов) и один конец. Вместо категорий $F\text{Set}$ и P также приходится брать их нетривиальные обобщения, причем многоосновной аналог P вообще не является подкатегорией многоосновного аналога $F\text{Set}$. Изложение всего этого занимает достаточно много места и будет предметом другой публикации.

Наконец, имеются основания предполагать, что вербальные подкатегории категории $F\text{Set}$ являются естественными инвариантами, позволяющими некоторым образом классифицировать тождества. Например, для многообразий линейных (мультиоператорных) алгебр автором было показано, что такое многообразие определяется полилинейными тождествами тогда и только тогда, если оно является (с точностью до рациональной эквивалентности) многообразием всех алгебр над некоторой линейной Σ -операдой [14–17]. Можно сформулировать и доказать и нелинейный аналог этого результата. Недавно удалось показать, что аналогичный факт имеет место и для многообразий супералгебр [18]. В [19] начато построение теории эквивалентности Мориты для линейных Σ -операд.

Автор выражает благодарность рецензенту за замечания, способствовавшие улучшению качества текста работы.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Общая алгебра* / В. А. Артамонов, В. Н. Салий, Л. А. Скорняков и др. Под общ. ред. Л. А. Скорнякова. М.: Наука, 1991. Т. 2
2. *May J. P.* The geometry of iterated loop spaces. Berlin: Springer-Verl., 1972. (Lecture Notes in Math.; 271).
3. *Бордман Дж., Фогт Р.* Гомотопически инвариантные алгебраические структуры на топологических пространствах. М.: Мир, 1977.
4. *Тронин С. Н.* Абстрактные клоны и операды // *Логика и приложения: Тез. междунар. конфер., посвящ. 60-летию со дня рожд. акад. Ю. Л. Ершова.* Новосибирск, 4–6 мая 2000 г. Новосибирск, 2000. С. 100.
5. *Артамонов В. А.* Клоны полилинейных операций // *Успехи мат. наук.* 1969. Т. 24, № 1. С. 47–59.
6. *Ginzburg V., Kapranov M.* Koszul duality for operads // *Duke Math. J.* 1994. V. 76, N 1. P. 203–272.
7. *Ginzburg V., Kapranov M.* Erratum to «Koszul duality for operads» // *Duke Math. J.* 1995. V. 80, N 1. P. 293.
8. *Operads: Proc. of Renaissance Conferences* / J.-L. Loday, J. D. Stasheff, A. A. Voronov (Eds.) *Contemp. Math.* 1996. V. 202.
9. *Kapranov M.* Operads and Algebraic Geometry // *Proc. Intern congr. math. Berlin, Aug. 18–27, 1998.* V. II. Invited Lectures. Berlin, 1998. P. 277–286. (Documenta Math. Extra Volume ICM. II).
10. *Smirnov V. A.* Simplicial and Operad Methods in Algebraic Topology. Providence, R.I.: Amer. Math. Soc., 2001. (Translations of Math. Monographs; 198).
11. *Джонстон П.* Теория топосов. М.: Мир, 1986.
12. *Мальцев А. И.* Структурная характеристика некоторых классов алгебр // *Докл. АН СССР.* 1958. Т. 120, № 1. С. 29–32.
13. *Пинус А. Г.* Инварианты отношения рациональной эквивалентности // *Сиб. мат. журн.* 2000. Т. 41, № 2. С. 430–436.

14. Тронин С. Н. О многообразиях, задаваемых полилинейными тождествами // Тез. сообщ. XIX Всесоюзн. алгебр. конференции, 9–11 сент. 1987. Ч 2. Львов, 1987. С. 280.
15. Тронин С. Н. О некоторых свойствах финитарных алгебраических теорий // Тез. сообщ. V Сибирской школы по многообразиям алгебраических систем, 1–5 июля 1988. Барнаул, 1988. С. 68–70.
16. Тронин С. Н. О некоторых свойствах алгебраических теорий многообразий линейных алгебр. I. Многообразия, задаваемые полилинейными тождествами / Казанский гос. ун-т. Казань, 1988. 31 Деп. в ВИНТИ 11.08.88, № 6511-B88.
17. Тронин С. Н. О ретракциях свободных алгебр и модулей: Дис. ... канд. физ.-мат. наук. Кишинев, 1989.
18. Тронин С. Н. Многообразия супералгебр и линейные операды // Теория функций, ее приложения и смежные вопросы: Материалы школы-конференции, посвящ. 130-летию со дня рожд. Д. Ф. Егорова, Казань, 13–18 сент. 1999. Казань: Казанское мат. общество, 1999. С. 224–227.
19. Тронин С. Н., Кош О. А. Матричные линейные операды // Изв. вузов. Математика. 2000. Т. 6. С. 52–63.

Статья поступила 3 апреля 2001 г., окончательный вариант — 27 февраля 2002 г.

Тронин Сергей Николаевич

*Казанский гос. университет, механико-математический факультет,
кафедра алгебры, Казань 420008*

Serge.Tronin@ksu.ru