

РЕДКИЕ ПАРАГЕНЕЗИСЫ АЛЕКСАНДРИТА НА ТЕРРИТОРИИ УРАЛЬСКОЙ ИЗУМРУДОНОСНОЙ ПОЛОСЫ

Попов М.П.¹ (popovm1@yandex.ru), Николаев А.Г.² (anatolij-nikolaev@yandex.ru)

¹Уральское отделение РМО, Уральский государственный горный университет

²Казанское отделение РМО, Казанский федеральный университет

RARE PARAGENESIS OF ALEXANDRITE IN THE TERRITORY OF THE URAL EMERALD BAND

Popov M.P.¹ (popovm1@yandex.ru), Nikolaev A.G.² (anatolij-nikolaev@yandex.ru)

¹Ural branch of the RMO, Ural State Mining University

²Kazan branch of RMO, Kazan Federal University

Уральская Изумрудоносная полоса является уникальным рудным и минералогическим объектом, который известен с 1831года. За это время открыты десятки месторождений и проявлений с изумрудной и хризобериллиновой минерализацией. За долгие годы исследований на территории уральской изумрудоносной полосы достаточно часто фиксировались четыре основных минеральных ассоциаций, в которых встречаются александрит и хризоберилл:

Первый тип – слюдитовые комплексы

В слюдитовых изумрудоносных комплексах хризоберилл встречается в разных зонах. Среди зелёных слюдитов отмечаются линзовидные выделения и прожилки зеленовато-серого хризоберилла мощностью 3-5 см, наряду с ним встречается фенакит, апатит, хромит, флюорит. Среди буровато-серых слюдитов хризоберилл представлен, в основном, александритом с разной интенсивностью окраски. Наиболее густой цвет, сочетающийся с высокой прозрачностью, свойственен александритам, приуроченным к фронтальным частям этой зоны. В парагенезисе с александритом находятся берилл, изумруд, апатит, хромит, флюорит, турмалин. Слюдиты, в которых встречается александрит и хризоберилл, представлены флогопитом.

Второй тип – плагиоклазовые жилы в слюдитах

Александрит находится на контакте плагиоклаза и флогопита, который представлен произвольно ориентированными чешуйками темно-зеленого цвета. Иногда кристаллы и выделения хризоберилла находятся внутри желваков плагиоклаза. Обычно интенсивно окрашенные александриты в таком типе парагенезиса не встречаются, а хризоберилл имеет окраску от желтовато-коричневой до зеленовато-синей. Совместно с хризобериллом встречаются берилл, флюорит, бавенит.

Третий тип – хлоритовые зоны с фенакитом и промежуточной маргаритовой оторочкой из слюдитовых комплексов.

Александрит в большинстве случаев находится в хлоритовых зонах, которые сменяются флогопитовыми или тальковыми зонами. Минерал представлен в виде отдельных кристаллов или мелко-среднезернистых агрегатов, которые образуют линзовидные тела. Обычно александриты имеют слабый реверс (серо-голубая окраска). Совместно с александритом встречаются фенакит, ильменит, апатит.

Четвёртый тип – мусковит-флюоритовые линзы из слюдитовых комплексов

Достаточно редко александрит встречается в мусковит-флюоритовых линзах, которые находятся в слюдитовых комплексах. Минерал представлен в виде мелких кристаллов (5-7 мм), присутствующих во флюорите.

Пятый тип – агрегативные выделения alexandrita в слюдитовых жилах (все минералы диагностированы и изучены с помощью микроанализатора GEOL JXA-8100 и СЭМ VEGA LMS с энергодисперсионной приставкой Xplore 30).

1. В 2019 году изучен редкий парагенезис alexandrita с изумрудом. Обычно эти два драгоценных камня очень редко встречаются. В серо-коричневых слюдитовых жилах обнаружен среднезернистый агрегат в котором в парагенезисе находились следующие минералы: изумруд + alexandрит + монацит + флюорит + кальцит + флогопит (рис. 5А). Между изумрудом и alexandритом отмечены индукционные грани, что говорит о совместном образовании минералов. В alexandрите из данного парагенезиса были изучены минеральные включения, которые диагностированы методами КР-спектроскопии и представлены: рутил, берилл, а также карбонат из группы тенгерита (кимураит-(Y)). Другие солевые фазы предположительно отнесены к нерастворимым кристаллогидратам бериллия (BeCO или $\text{Be}(\text{PO}_4)_2$) [1].

2. В 2019 году в мелкозернистом агрегате alexandrita из темно-зеленой слюдитовой жилы описан очень редкий парагенезис alexandрит + флогопит + изумруд + алланит + Cr-шпинель + флюорит (рис. 5Б). Изумруд с alexandритом образуют сингенетические срастания. Крупные зерна алланита описаны на контакте флогопита и alexandrita.

3. В 2024 году при изучении низкосортного ограночного сырья с Черемшанского месторождения был обнаружен и описан необычный парагенезис: - alexandрит + кварц + флогопит + КПШ + монацит + пирит, который был обнаружен жиле серого флогопита. Данный парагенезис можно назвать «пегматоидный», что хорошо согласуется с геологическим строением самого месторождения.




Рис.1. А- парагенезис тип 5(1). Sp-11 – alexandrite, Sp-12 – emerald, Sp-14 – monazite, Sp-15 – fluorite; Б- парагенезис тип 5(2). Sp-3 – allanite, light gray – floopite, mediumgray is emerald, dark gray is alexandrite.

Fig.1. A- paragenesis type 5(1). Sp-11 – alexandrite, Sp-12 – emerald, Sp-14 – monazite, Sp-15 – fluorite; B- paragenesis type 5(2). Sp-3 – allanite, light gray – floopite, mediumgray is emerald, dark gray is alexandrite.

Список литературы

[1] Пахомова В. А., Попов М. П., Федосеев Д. Г., Культенко С. Ю., Тишкина В. Б., Шиш В. В., Камынин В. А., Соляник В. А., Гусарова В. С. Включения в alexandrite Мариинского месторождения по данным Раман-спектроскопии и термобарогеохимии // Мат-лы междунар. конф. «Минералогические музеи 2019: минералогия вчера, сегодня, завтра». СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2019. С 206–207.