

УДК 517.54

УРАВНЕНИЕ ГАХОВА ДЛЯ СМЕШАННОЙ  
ОБРАТНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ПО ПАРАМЕТРУ  $x$   
НА РИМАНОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
С ПРОСТОЙ ТОЧКОЙ ВЕТВЛЕНИЯ  
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ

*С.Р. Насыров, Л.Ю. Низамиева*

**Аннотация**

Доказана разрешимость аналога уравнения Гахова для внешней обратной краевой задачи на римановой поверхности, содержащей единственную точку ветвления на бесконечности. Доказательство основано на методе вращения векторных полей.

**Ключевые слова:** смешанная обратная краевая задача, уравнение Гахова, вращение векторного поля, риманова поверхность.

---

**Введение**

Смешанные обратные краевые задачи для аналитических функций являются важным классом краевых задач с неизвестной (свободной) границей. Как правило, в этих задачах ищутся область с частично неизвестной границей и аналитическая в этой области функция по заданным краевым условиям. На неизвестной части краевые значения неизвестной функции задаются через некоторый параметр, в качестве которого выбирается дуговая абсцисса  $s$ , декартова координата  $x$ , полярный радиус или полярный угол.

В зависимости от того, содержит искомая область бесконечно удаленную точку или нет, задачи делятся на два класса: внешние и внутренние.

Если известная часть границы полностью отсутствует, то такие задачи называют обратными краевыми задачами. Их систематическое исследование началось с работ Г.Г. Тумашева и М.Т. Нужина (см., например, [1]). Одной из основных обратных краевых задач для аналитических функций является внешняя обратная краевая задача по параметру  $s$  в постановке Ф.Д. Гахова. Ф.Д. Гахов нашел уравнение для определения полюса функции, обратной к искомой, и доказал его разрешимость. Это уравнение стало называться его именем. Оно изучалось многими авторами, в том числе Л.А. Аксентьевым и его учениками (см., например, [2, 3]).

Впервые постановку внутренней смешанной обратной краевой задачи по параметру  $x$  дал В.Н. Монахов [4]. Им исследовалась разрешимость задачи для областей с полигональной известной границей, а затем аппроксимацией – и для произвольных спрямляемых границ. В работах [5, 6] было замечено, что с использованием результатов [4] можно доказать разрешимость внутренней задачи на римановых поверхностях без точек ветвления с достаточно произвольной границей. Более подробно история вопроса и библиография приведены в [7].

Впервые внешняя смешанная обратная краевая задача по параметру  $x$  была исследована в [8]. Г.Р. Галиуллиной получен аналог уравнения Ф.Д. Гахова для

отыскания положения неизвестного полюса в верхней полуплоскости в случае, когда известная часть границы полигональна, предложен метод доказательства разрешимости этого уравнения с использованием техники вращения векторных полей.

Представляет интерес исследование смешанных обратных краевых задач на римановых поверхностях с точками ветвления. В [7] была рассмотрена внутренняя смешанная обратная краевая задача по параметру  $x$  на полигональных римановых поверхностях с простыми точками ветвления и доказана локальная единственность решения.

В настоящей статье дается постановка внешней смешанной обратной краевой задачи по параметру  $x$  на полигональной римановой поверхности, содержащей единственную точку ветвления, расположенную над бесконечно удаленной точкой. Построен аналог уравнения Гахова и доказана его разрешимость.

### 1. Постановка задачи и построение интегрального представления решения

Пусть  $D_z$  – односвязная многолистная область (риманова поверхность) над сферой Римана, содержащая ровно одну точку  $P$ , лежащую над  $\infty$  (точка  $P$  – простая точка ветвления, других точек ветвления в  $D_z$  нет), с границей  $L_z$ , которая состоит из известной дуги  $L_z^1$  и искомой дуги  $L_z^2$ . В дальнейшем будем считать, что:

1)  $L_z^1$  – полигон с вершинами  $z_k = x_k + iy_k$ ,  $k = 1, \dots, n$ , причем положительное направление обхода  $L_z^1$  соответствует движению от  $z_1$  к  $z_n$ , и  $x_1 = a < b = x_n$ ;

2)  $L_z^2$  такова, что любая прямая, параллельная мнимой оси, пересекает ее не более, чем в одной точке;

3) в своих граничных точках  $D_z$  локально однолистка (рис. 1).

Требуется найти  $L_z^2$  и аналитическую в области  $D_z$  функцию  $\omega(z)$ , конформно отображающую  $D_z$  на жорданову область  $D_\omega$  и удовлетворяющую следующим краевым условиям:

а) В плоскости  $\omega = \varphi + i\psi$  дуге  $L_z^2$  соответствует дуга  $L_\omega^2$  с уравнением  $\varphi = f_1(x)$ ,  $\psi = f_2(x)$ , где  $f_1(x) + if_2(x)$ ,  $x \in [a, b]$ , – граничные значения искомой аналитической функции  $\omega(z)$  на  $L_z^2$  и  $x = \operatorname{Re} z$ . Будем предполагать, что функция  $\omega(x)$  непрерывно дифференцируема и  $\omega'(x) \neq 0$ ,  $a \leq x \leq b$ .

б) Уравнение дуги  $L_\omega^1$ , дополняющей  $L_\omega^2$  до замкнутого контура  $L_\omega = \partial D_\omega$ ,

$$\Phi(\varphi, \psi) = 0,$$

считается заданным. Предполагается, что функция  $\Phi(\varphi, \psi)$  дважды непрерывно дифференцируема, и гладкие дуги  $L_\omega^1$  и  $L_\omega^2$  образуют в точках стыка  $\omega_1$  и  $\omega_2$  ненулевые углы  $\pi\gamma_1$  и  $\pi\gamma_2$ .

Проведем из точек  $z_1, z_n$  вверх вертикальные лучи  $l_1, l_n$  и обозначим через  $\pi\alpha_1, \pi\alpha_n$  углы, образованные первым и  $(n-1)$ -м звеньями ломаной  $L_z^1$  с этими лучами. Пусть  $\pi\alpha_k$  – внутренние углы области  $D_z$  в точках  $z_k$ ,  $k = 2, \dots, n-1$ .

По аналогии с внутренней задачей [6] нетрудно показать, что необходимым условием разрешимости рассматриваемой нами задачи является следующее ограничение на известную часть границы: ломаная  $L_z^1$ , дополненная лучами  $l_1, l_n$ , является границей многоугольной римановой поверхности без точек ветвления, причем

$$\sum_{k=1}^n (\alpha_k - 1) = 5.$$

В дальнейшем будем считать приведенные выше условия выполненными.




Рис. 1

Для нахождения интегрального представления решения воспользуемся методом, предложенным в [4]. Конформно отобразим полуплоскость  $D_\zeta = \{\text{Im } \zeta > 0\}$  на  $D_\omega$  функцией  $\omega = \lambda(\zeta)$  так, чтобы точки  $\infty, t_1 = 1, t_n = -1$ , лежащие на вещественной оси, переходили соответственно в фиксированные точки  $\omega_0 \in L_\omega^1, \omega_1$  и  $\omega_2$ . Пусть  $t_k$  – точки на границе  $D_\zeta$ , соответствующие вершинам ломанной  $L_z^1, k = 1, \dots, n$ . Обозначим через  $\zeta_0$  точку в  $D_\zeta$ , соответствующую точке  $\infty$  в плоскости  $z$ .

Определим функцию  $z = F(\zeta) = \omega^{-1}(\lambda(\zeta))$ , конформно отображающую верхнюю полуплоскость  $D_\zeta$  на область  $D_z$ . Если она известна, то известно и уравнение  $z = F(t), -1 \leq t \leq 1$ , контура  $L_z^2$ , а функция  $\omega(z)$  восстанавливается по формуле  $\omega = \lambda(F^{-1}(z))$ . Поэтому в дальнейшем функцию  $z = F(\zeta)$  будем называть решением задачи.

Найдем краевые условия, которым на вещественной оси удовлетворяет функция  $z = F(\zeta) = x(\zeta) + iy(\zeta)$ . Сравнивая граничные значения функций  $\omega(z)$  и  $\lambda(\zeta)$  на участках, соответствующих  $L_\omega^2$ , получим соотношение

$$f_1(x) + if_2(x) = \lambda(t),$$

из которого найдем зависимость

$$x = H(t), \quad |t| < 1. \tag{1}$$

Пусть уравнения прямых, на которых лежат стороны полигона, имеют вид

$$a_k x - b_k y = c_k, \quad k = 1, \dots, n - 1.$$

Тогда

$$a_k x(t) - b_k y(t) = c_k, \quad t \in (t_k, t_{k+1}), \quad k = 1, \dots, n-1. \quad (2)$$

Отметим, что здесь через  $(t_k, t_{k+1})$  обозначена часть границы  $D_\zeta$  в расширенной комплексной плоскости от точки  $t_k$  от точки  $t_{k+1}$ , проходимая в положительном направлении.

Дифференцируя (1) и (2), получим:

$$a_k \frac{dx(t)}{dt} - b_k \frac{dy(t)}{dt} = 0, \quad t \in (t_k, t_{k+1}), \quad k = 1, \dots, n-1,$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = h(t), \quad t \in (-1, 1),$$

где  $h(t) = H'(t) \leq 0$  при  $t \in (-1, 1)$ , так как функция  $x(t)$  монотонно убывает.

Полученные условия представляют собой краевую задачу Гильберта с разрывными коэффициентами (см., например, [9]) для функции  $dz(\zeta)/d\zeta$  в полуплоскости  $D_\zeta$ :

$$\operatorname{Re}[(a(t) + ib(t))dz(t)/dt] = c(t), \quad t \in (-\infty, \infty),$$

где

$$a(t) = \begin{cases} a_k, & t \in (t_k, t_{k+1}), \quad k = 1, \dots, n-1, \\ 1, & t \in (-1, 1), \end{cases}$$

$$b(t) = \begin{cases} b_k, & t \in (t_k, t_{k+1}), \quad k = 1, \dots, n-1, \\ 0, & t \in (-1, 1), \end{cases}$$

$$c(t) = \begin{cases} 0, & |t| > 1, \\ h(t), & t \in (-1, 1). \end{cases}$$

Решение ищем в классе функций  $dz(\zeta)/d\zeta$ , голоморфных в  $D_\zeta \setminus \{\zeta_0\}$ , имеющих полюс третьего порядка в точке  $\zeta_0$ , непрерывно продолжимых на границу  $\overline{D}_\zeta$  за исключением, быть может, точек  $t_k$ ,  $1 \leq k \leq n$ , ограниченных в точках  $t_k$ , соответствующих вершинам полигона с углами, большими  $\pi$ , и имеющих интегрируемые особенности в остальных точках  $t_k$ .

Перепишем задачу Гильберта с разрывными коэффициентами в виде

$$\operatorname{Re}[(a(t) + ib(t))\Phi(t)] = c(t)|t - \zeta_0|^6,$$

где

$$\Phi(\zeta) = (\zeta - \zeta_0)^3(\zeta - \bar{\zeta}_0)^3 dz(\zeta)/d\zeta.$$

Рассмотрим функцию

$$\Pi(\zeta) = e^{i\mu} \prod_{k=1}^n (\zeta - t_k)^{\alpha_k - 1}.$$

Она является аналитической в  $D_\zeta$ . Фиксируем некоторую однозначную ветвь этой функции и подберем вещественную константу  $\mu$  таким образом, чтобы  $\Pi(t) < 0$ ,  $t \in (-1, 1)$ .

Пусть  $\alpha_1 \leq 1$ ,  $\alpha_n \leq 1$ . Функция  $\Pi(\zeta)$  может быть взята за каноническую функцию однородной задачи, и тогда решение запишется в следующем виде:

$$\Phi(\zeta) = \frac{dz(\zeta)}{d\zeta} (\zeta - \zeta_0)^3 (\zeta - \bar{\zeta}_0)^3 = \frac{\Pi(\zeta)}{\pi i} \int_{-1}^1 \frac{h(t)|t - \zeta_0|^6}{\Pi(t)(t - \zeta)} dt + P(\zeta)\Pi(\zeta),$$

где  $P(\zeta)$  – некоторый многочлен.

Нетрудно видеть, что на бесконечности  $|\Pi(\zeta)| \sim |\zeta|^d$ , где  $d = \sum_{k=1}^n (\alpha_k - 1) = 5$ . Чтобы искомый контур был конечен, следует положить  $P(\zeta) \equiv 0$ , так как

$$\frac{\Pi(\zeta)}{(\zeta - \zeta_0)^3(\zeta - \bar{\zeta}_0)^3} \sim \frac{1}{\zeta}, \quad \zeta \rightarrow \infty.$$

Итак, единственное решение задачи в случае  $\alpha_1 \leq 1$ ,  $\alpha_n \leq 1$ , имеет вид

$$z = F(\zeta) = z_1 + \frac{1}{\pi i} \int_{-1}^{\zeta} \frac{\Pi(\zeta) d\zeta}{(\zeta - \zeta_0)^3(\zeta - \bar{\zeta}_0)^3} \int_{-1}^1 \frac{h(t)|t - \zeta_0|^6}{\Pi(t)(t - \zeta)} dt. \quad (3)$$

Очевидно, что (3) определяет одно из решений задачи и в случае, когда  $\alpha_1 > 1$  или  $\alpha_n > 1$ .

Отметим, что в интегральное представление решения (3) входят акцессорные параметры  $t_k$ ,  $2 \leq k \leq n - 1$ . Проблема определения этих параметров является отдельной сложной задачей и в данной статье не исследуется. Основное внимание уделяется вопросу об однозначности аналитической функции, определяемой этим интегральным представлением.

## 2. Разрешимость уравнения Гахова

Условием однозначности функции  $F(\zeta)$ , определенной формулой (3), будет служить равенство  $c_{-1} = 0$ , где  $c_{-1}$  – вычет функции  $dF(\zeta)/d\zeta$  в точке  $\zeta = \zeta_0$ . Имеем:

$$\operatorname{res}_{\zeta=\zeta_0} \frac{dF(\zeta)}{d\zeta} = \frac{1}{2} \lim_{\zeta \rightarrow \zeta_0} \frac{d^2}{d\zeta^2} \left\{ (\zeta - \zeta_0)^3 \frac{dF(\zeta)}{d\zeta} \right\}.$$

Вычислим производные функции  $(\zeta - \zeta_0)^3 dF(\zeta)/d\zeta$ :

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\zeta} \left[ (\zeta - \zeta_0)^3 \frac{dF(\zeta)}{d\zeta} \right] &= \frac{\Pi(\zeta)}{\pi i (\zeta - \bar{\zeta}_0)^3} \left\{ \left[ -\frac{3}{\zeta - \bar{\zeta}_0} + \sum_{j=1}^n \frac{\beta_j}{\zeta - t_j} \right] \widetilde{M}(\zeta) + \widetilde{N}(\zeta) \right\}, \\ \frac{d^2}{d\zeta^2} \left[ (\zeta - \zeta_0)^3 \frac{dF(\zeta)}{d\zeta} \right] &= \frac{\Pi(\zeta)}{\pi i (\zeta - \bar{\zeta}_0)^3} \times \\ &\times \left\{ \widetilde{M}(\zeta) \left[ \frac{12}{(\zeta - \bar{\zeta}_0)^2} - \frac{6}{\zeta - \bar{\zeta}_0} \sum_{j=1}^n \frac{\beta_j}{\zeta - t_j} + \left( \sum_{j=1}^n \frac{\beta_j}{\zeta - t_j} \right)^2 - \right. \right. \\ &\left. \left. - \sum_{j=1}^n \frac{\beta_j}{(\zeta - t_j)^2} \right] + \widetilde{N}(\zeta) \left( 2 \sum_{j=1}^n \frac{\beta_j}{\zeta - t_j} - \frac{6}{\zeta - \bar{\zeta}_0} \right) + 2\widetilde{Q}(\zeta) \right\}, \end{aligned}$$

где  $\beta_j = \alpha_j - 1$ ,  $j = 1, \dots, n$ ,

$$\widetilde{M}(\zeta) = \int_{-1}^1 \frac{h(t)|t - \zeta_0|^6}{\Pi(t)(t - \zeta)} dt, \quad \widetilde{N}(\zeta) = \int_{-1}^1 \frac{h(t)|t - \zeta_0|^6}{\Pi(t)(t - \zeta)^2} dt, \quad \widetilde{Q}(\zeta) = \int_{-1}^1 \frac{h(t)|t - \zeta_0|^6}{\Pi(t)(t - \zeta)^3} dt.$$

Тогда

$$\operatorname{res}_{\zeta=\zeta_0} \frac{dF(\zeta)}{d\zeta} = \frac{\Pi(\zeta_0)}{2\pi i(\zeta_0 - \bar{\zeta}_0)^3} \left\{ M(\zeta_0) \left[ \frac{12}{(\zeta_0 - \bar{\zeta}_0)^2} - \frac{6}{\zeta_0 - \bar{\zeta}_0} \sum_{j=1}^n \frac{\beta_j}{\zeta_0 - t_j} + \left( \sum_{j=1}^n \frac{\beta_j}{\zeta_0 - t_j} \right)^2 - \sum_{j=1}^n \frac{\beta_j}{(\zeta_0 - t_j)^2} \right] + N(\zeta_0) \left( 2 \sum_{j=1}^n \frac{\beta_j}{\zeta_0 - t_j} - \frac{6}{\zeta_0 - \bar{\zeta}_0} \right) + 2Q(\zeta_0) \right\},$$

где

$$M(\zeta_0) = \int_{-1}^1 \frac{h(t)|t - \zeta_0|^6}{\Pi(t)(t - \zeta_0)} dt, \quad N(\zeta_0) = \int_{-1}^1 \frac{h(t)|t - \zeta_0|^6}{\Pi(t)(t - \zeta_0)^2} dt, \quad Q(\zeta_0) = \int_{-1}^1 \frac{h(t)|t - \zeta_0|^6}{\Pi(t)(t - \zeta_0)^3} dt.$$

Ясно, что  $\Pi(\zeta) = e^{i\mu} \prod_{k=1}^n (\zeta - t_k)^{\beta_k} \neq 0$  при  $\zeta \neq t_k$ ,  $k = 1, \dots, n$ . Таким образом, точка  $\zeta_0$  должна удовлетворять уравнению

$$\left[ \frac{12}{(\zeta - \bar{\zeta})^2} - \frac{6}{\zeta - \bar{\zeta}} \sum_{j=1}^n \frac{\beta_j}{\zeta - t_j} + \left( \sum_{j=1}^n \frac{\beta_j}{\zeta - t_j} \right)^2 - \sum_{j=1}^n \frac{\beta_j}{(\zeta - t_j)^2} \right] M(\zeta) + \left( 2 \sum_{j=1}^n \frac{\beta_j}{\zeta - t_j} - \frac{6}{\zeta - \bar{\zeta}} \right) N(\zeta) + 2Q(\zeta) = 0. \quad (4)$$

Назовем (4) *уравнением Гахова для внешней смешанной обратной краевой задачи по параметру  $x$* .

Обозначим

$$S(\zeta) = \sum_{j=1}^n \frac{\beta_j}{\zeta - t_j}.$$

Тогда (4) эквивалентно уравнению

$$G(\zeta) := [12 - 6(\zeta - \bar{\zeta})S(\zeta) + (\zeta - \bar{\zeta})^2(S^2(\zeta) + S'(\zeta))] M(\zeta) + 2[(\zeta - \bar{\zeta})^2S(\zeta) - 3(\zeta - \bar{\zeta})] N(\zeta) + 2(\zeta - \bar{\zeta})^2Q(\zeta) = 0. \quad (5)$$

Докажем, что существует решение данного уравнения в верхней полуплоскости.

Предварительно покажем, что  $M(\xi)$ ,  $\xi \in \mathbb{R}$ , обращается в нуль ровно в одной точке  $\tilde{\xi}$ , принадлежащей интервалу  $(-1, 1)$ . Действительно, функция

$$M(\xi) = \int_{-1}^1 \frac{h(t)}{\Pi(t)} (t - \xi)^5 dt$$

строго монотонно убывает на вещественной оси и  $M(-1) > 0$ ,  $M(1) < 0$ .

Функция  $G(\zeta)$  определяет некоторое векторное поле в верхней полуплоскости. Это векторное поле непрерывно продолжается в замыкание верхней полуплоскости за исключением точек  $t_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ . Докажем, что это векторное поле обращается в нуль по крайней мере в одной точке  $\zeta$  верхней полуплоскости.

Рассмотрим область  $Q$ , которая получается из полукруга  $\{|\zeta| < R, \operatorname{Im} \zeta > 0\}$  выбрасыванием кругов  $\{|z - t_j| < \varepsilon\}$ ,  $1 \leq j \leq n$ , и  $\{|\zeta - \tilde{\xi}| < \delta\}$ . Граница  $\partial Q$  состоит из полуокружностей

$$T_R = \{|\zeta| = R, \operatorname{Im} \zeta \geq 0\}, \quad T_\varepsilon^j = \{|\zeta - t_j| = \varepsilon, \operatorname{Im} \zeta \geq 0\}, \quad 1 \leq j \leq n,$$

$$T_\delta = \{|\zeta - \tilde{\xi}| = \delta, \operatorname{Im} \zeta \geq 0\},$$

и отрезков  $\Delta_k$ ,  $1 \leq k \leq n+2$  действительной оси, не содержащих точек  $t_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , и  $\tilde{\xi}$ .

Если векторное поле  $G$  не обращается в нуль в  $D_\zeta$ , то оно отлично от нуля на  $\partial Q$ . Подсчитаем вращение векторного поля  $G$  по границе области  $Q$  при достаточно большом  $R$  и достаточно малых  $\varepsilon$  и  $\delta$  и покажем, что это вращение отлично от нуля. Это будет означать, что векторное поле на самом деле обращается в нуль по крайней в одной точке из области  $Q \subset D_\zeta$  (см., например, [10]). Таким образом будет доказана разрешимость уравнения Гахова в  $D_\zeta$ .

Обозначим через  $V_G(\gamma)$  вращение векторного поля  $G$  вдоль кривой  $\gamma$ . Имеем

$$V_G(\partial Q) = V_G(T_R) + \sum_{j=1}^n V_G(T_\varepsilon^j) + \sum_{k=1}^{n+2} V_G(\Delta_k) + V_G(T_\delta).$$

Обход соответствующих участков границы  $\partial Q$  осуществляется так, что область  $Q$  при этом остается слева.

Если  $\xi \in \Delta_k$ , то  $G(\xi) = 12M(\xi)$  — непрерывная вещественная функция, не обращающаяся в нуль, поэтому  $V_G(\Delta_k) = 0$ ,  $1 \leq k \leq n+2$ .

Найдем теперь  $V_G(T_R)$  при больших  $R$ . Пусть  $\zeta = Re^{i\theta}$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$ . Нетрудно убедиться в том, что

$$M(\zeta) \sim -a\zeta^2\bar{\zeta}^3, \quad N(\zeta) \sim a\zeta\bar{\zeta}^3, \quad Q(\zeta) \sim -a\bar{\zeta}^3 \quad \text{при } R = |\zeta| \rightarrow \infty \quad (6)$$

равномерно по  $\theta$ , где

$$a = \int_{-1}^1 \frac{h(t)}{\Pi(t)} dt > 0.$$

Также равномерно по  $\theta$

$$S(\zeta) \sim \sum_{j=1}^n \frac{\beta_j}{\zeta} = \frac{5}{\zeta}, \quad S'(\zeta) \sim -\frac{5}{\zeta^2}, \quad R \rightarrow \infty. \quad (7)$$

Из (5)–(7) следует, что

$$\begin{aligned} G(\zeta) \sim -a\zeta^2\bar{\zeta}^3 \left[ 12 - 6(\zeta - \bar{\zeta})\frac{5}{\zeta} + (\zeta - \bar{\zeta})^2 \left( \frac{25}{\zeta^2} - \frac{5}{\zeta^2} \right) \right] + \\ + 2a\zeta\bar{\zeta}^3 \left[ (\zeta - \bar{\zeta})^2 \frac{5}{\zeta} - 3(\zeta - \bar{\zeta}) \right] - 2a\bar{\zeta}^3(\zeta - \bar{\zeta})^2 = -12a\bar{\zeta}^5. \end{aligned}$$

Тогда при достаточно больших  $R$

$$V_G(T_R) = \int_0^\pi d \arg(-12aR^5 e^{-i5\theta}) = -5\pi.$$

Докажем, что

$$V_G(T_\varepsilon^j) = 0, \quad 0 \leq j \leq n. \quad (8)$$

Пусть  $\zeta = t_j + \varepsilon e^{i\theta}$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$ . Имеем, что

$$S(\zeta) \sim \frac{\beta_j}{\zeta - t_j}, \quad S'(\zeta) \sim -\frac{\beta_j}{(\zeta - t_j)^2}, \quad \varepsilon = |\zeta - t_j| \rightarrow 0,$$

равномерно по  $\theta$ . Тогда

$$G(\zeta) \sim M(t_j)G_1(\zeta), \quad \varepsilon \rightarrow 0,$$

где

$$G_1(\zeta) = 12 - 6\beta_j \frac{\zeta - \bar{\zeta}}{\zeta - t_j} - (\beta_j - \beta_j^2) \left( \frac{\zeta - \bar{\zeta}}{\zeta - t_j} \right)^2.$$

Далее,

$$\frac{\zeta - \bar{\zeta}}{\zeta - t_j} = 1 - e^{-i2\theta},$$

поэтому

$$\operatorname{Re} \frac{\zeta - \bar{\zeta}}{\zeta - t_j} \geq 0, \quad \left| \frac{\zeta - \bar{\zeta}}{\zeta - t_j} \right| \leq 2.$$

Если  $\beta_j > 0$ , то

$$\operatorname{Re} G_1(\zeta) \geq 12 - 12\beta_j - 4(\beta_j - \beta_j^2) = 4(3 - \beta_j)(1 - \beta_j) > 0.$$

Если же  $\beta_j < 0$ , то

$$\operatorname{Re} G_1(\zeta) \geq 12 - 4|\beta_j - \beta_j^2| = 12 - 4|\beta_j|(1 + |\beta_j|) > 0,$$

то есть справедливо (8).

Покажем, наконец, что  $|V_G(T_\delta)| = \pi$  при малых  $\delta$ .

Рассмотрим поведение  $M(\zeta)$  и  $N(\zeta)$  в окрестности точки  $\tilde{\xi}$ . Пусть  $\zeta = \tilde{\xi} + \tau$ . Обозначим

$$A_k = \int_{-1}^1 \frac{h(t)}{\Pi(t)} (t - \tilde{\xi})^k dt, \quad k \in \mathbb{N}.$$

В силу выбора  $\tilde{\xi}$  имеем  $A_5 = 0$ . Кроме того, очевидно, что  $A_4 > 0$ . Тогда

$$\begin{aligned} M(\zeta) &= \int_{-1}^1 \frac{h(t)}{\Pi(t)} (t - \tilde{\xi} - \tau)^2 (t - \tilde{\xi} - \bar{\tau})^3 dt = \\ &= \int_{-1}^1 \frac{h(t)}{\Pi(t)} [(t - \tilde{\xi})^5 - (2\tau + 3\bar{\tau})(t - \tilde{\xi})^4 + \dots] dt = \\ &= -(2\tau + 3\bar{\tau})A_4 + O(|\tau|^2), \quad |\tau| \rightarrow 0, \end{aligned}$$



$$N(\zeta) = \int_{-1}^1 \frac{h(t)}{\Pi(t)} (t - \tilde{\xi} - \tau)(t - \tilde{\xi} - \bar{\tau})^3 dt = A_4 + O(|\tau|), \quad |\tau| \rightarrow 0.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} G(\zeta) &= 12M(\zeta) - 6(\zeta - \bar{\zeta})N(\zeta) + O(|\tau|^2) = \\ &= -12(2\tau + 3\bar{\tau})A_4 - 6(\tau - \bar{\tau})A_4 + O(|\tau|^2) = -30A_4(\tau + \bar{\tau}) + O(|\tau|^2), \quad |\tau| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Отметим, что в силу того, что функция  $G(\zeta)$  является 5-аналитической,

$$G(\zeta) = -30A_4(\tau + \bar{\tau}) + \sum_{k=0}^5 \bar{\tau}^k \Phi_k(\tau),$$

где функции  $\Phi_k(\tau)$  аналитичны в окрестности нуля, и  $\Phi_0(0) = \Phi'_0(0) = \Phi_1(0) = 0$ . Следовательно, в некотором замкнутом круге  $|\tau| \leq \delta_0$  эти функции ограничены вместе со своими производными, поэтому

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \operatorname{Re} G(\tilde{\xi} + \delta e^{i\theta}) = 60A_4\delta \sin \theta - \operatorname{Im} \sum_{k=1}^5 \bar{\tau}^k [\tau \Phi'_k(\tau) - k\Phi_k(\tau)] = 60A_4\delta \sin \theta + O(\delta^2)$$

при  $\delta \rightarrow 0$ . Таким образом, существует  $c > 0$  такое, что при малых  $\delta$

$$\left| \frac{\partial}{\partial \theta} \operatorname{Re} G(\tilde{\xi} + \delta e^{i\theta}) - 60A_4\delta \sin \theta \right| \leq c\delta^2.$$

Определим при малых  $\delta$

$$\theta_0 = \theta_0(\delta) = \arcsin \frac{c\delta}{60A_4}.$$

При  $\theta_0 \leq \theta \leq \pi - \theta_0$  имеем

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \operatorname{Re} G(\tilde{\xi} + \delta e^{i\theta}) \geq 0,$$

следовательно, функция  $\operatorname{Re} G(\tilde{\xi} + \delta e^{i\theta})$  является монотонно возрастающей функцией по  $\theta$  на отрезке  $[\theta_0, \pi - \theta_0]$ .

Теперь рассмотрим значения  $G(\tilde{\xi} + \delta e^{i\theta})$  на отрезках  $[0, \theta_0]$ ,  $[\pi - \theta_0, \pi]$ . Поскольку

$$G(\tilde{\xi} + \delta e^{i\theta}) = -60A_4\delta \cos \theta + O(\delta^2), \quad \delta \rightarrow 0,$$

равномерно по  $\theta$ , то при  $\theta \in [0, \theta_0]$

$$\begin{aligned} |G(\tilde{\xi} + \delta e^{i\theta}) - G(\tilde{\xi} + \delta)| &\leq 60(1 - \cos \theta)\delta + O(\delta^2) \leq \\ &\leq 60(1 - \cos^2 \theta)\delta + O(\delta^2) = O(\delta^2), \quad \delta \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Так как

$$G(\tilde{\xi} + \delta) = 12M(\tilde{\xi} + \delta) = -60A_4\delta + O(\delta^2), \quad \delta \rightarrow 0,$$

при достаточно малых  $\delta$ , то значения  $G(\tilde{\xi} + \delta e^{i\theta})$  при  $\theta \in [0, \theta_0]$  лежат в левой полуплоскости. Аналогично показывается, что при  $\theta \in [\pi - \theta_0, \pi]$  и достаточно малых  $\delta$  значения  $G(\tilde{\xi} + \delta e^{i\theta})$  лежат в правой полуплоскости. В силу монотонности  $\operatorname{Re} G(\tilde{\xi} + \delta e^{i\theta})$  на  $[\theta_0, \pi - \theta_0]$  отсюда следует, что при малых  $\delta$  кривая  $G(\tilde{\xi} + \delta e^{i\theta})$ ,

$\theta \in [0, \pi]$ , пересекает мнимую ось в единственной точке  $A$ . Эта точка делит кривую на две части, одна из которых  $BA$  лежит в левой полуплоскости, а другая  $AC$  – в правой. Поскольку точка  $C$  лежит на мнимой оси, а точки  $B$  и  $C$  – на действительной, получаем, что в случае, когда  $C$  лежит в верхней полуплоскости,

$$V_G(T_\delta) = V_G(BA) + V_G(AC) = -\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\pi,$$

а если – в правой, то

$$V_G(T_\delta) = V_G(BA) + V_G(AC) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

Таким образом, вращение векторного поля  $V_G(\partial Q) = -5\pi \pm \pi \neq 0$ . Это означает, что векторное поле  $G$  обращается в нуль по крайней мере в одной точке области  $Q$ , следовательно, уравнение Гахова в  $D_\zeta$  имеет по крайней мере одно решение.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 08-01-00381 и № 06-01-81019-Бел).

### Summary

*S.R. Nasyrov, L.Yu. Nizamiyeva.* Gakhov Equation for Mixed Inverse Boundary Value Problem on Riemann Surface with a Simple Branch-Point over Infinity.

The paper proves solvability of a Gakhov equation analogue for external mixed inverse boundary value problem on a Riemann surface. The surface is supposed to contain a unique simple branch-point over the infinity. The proof method uses technique of vector field rotation.

**Key words:** mixed inverse boundary value problem, Gakhov equation, vector field rotation, Riemann surface.

### Литература

1. *Тумашев Г.Г., Нурулин М.Т.* Обратные краевые задачи и их приложения. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1965. – 333 с.
2. *Аксентьев Л.А.* Связь внешней обратной краевой задачи с внутренним радиусом области // Изв. вузов. Математика. – 1984. – № 2. – С. 3–11.
3. *Аксентьев Л.А., Елизаров А.М., Киндер М.И.* Обратные краевые задачи для многосвязных областей на римановых поверхностях рода нуль, I–III // Тр. семинара по краевым задачам. – Казань: Изд-во Казан. ун-та. I: 1984. – Вып. 21. – С. 19–32; II: 1985. – Вып. 22. – С. 16–29; III: 1987. – Вып. 23. – С. 25–36.
4. *Монахов В.Н.* Краевые задачи со свободными границами для эллиптических систем уравнений. – Новосибирск: Наука, 1977. – 424 с.
5. *Насыров С. Р.* О методе полигональной аппроксимации в смешанных обратных краевых задачах по параметру  $x$ . – Казань: Казан. гос. ун-т, 1982. – 48 с. – Деп. в ВИНТИ 17.05.82, № 2459-82.
6. *Насыров С.Р.* Смешанная обратная краевая задача на римановых поверхностях // Изв. вузов. Математика. – 1990. – № 10. – С. 25–36.
7. *Насыров С.Р., Фаизов И.З.* Локальная единственность решения смешанной обратной краевой задачи на полигональных римановых поверхностях с простыми точками ветвления // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. физ.-матем. науки. – 2006. – Т. 148, кн. 2. – С. 97–108.

- 
8. *Галиуллина Г.Р., Насыров С.Р.* Уравнение Гахова для внешней смешанной обратной краевой задачи по параметру  $x$  // Изв. вузов. Математика. – 2002. – № 10. – С. 48–55.
  9. *Гахов Ф.Д.* Краевые задачи. – М.: Наука, 1977. – 640 с.
  10. *Красносельский М.А. и др.* Векторные поля на плоскости. – М.: Физматгиз, 1963.

Поступила в редакцию  
25.09.07

---

**Насыров Семен Рафаилович** – доктор физико-математических наук, профессор кафедры математического анализа Казанского государственного университета.

E-mail: *snasyrov@ksu.ru*

**Низамиева Лилия Юнисовна** – старший преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин Казанского кооперативного института.

E-mail: *NizamievaLU@yandex.ru*